


Avertissements agricoles



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
RHÔNE-ALPES

Grandes Cultures

165, rue Garibaldi - Bâtiment B - B.P. 3202 - 69401 LYON Cédex 03

☎ 78.63.25.65

Abonnement annuel : 180 Frs - Régisseur Recettes DRAF Rhône-Alpes

Bulletin n° 16 - 11 Octobre 1991

COLZA : - grosses altises captures faibles (p.1)
 - pucerons à surveiller (p.1)
 - limaces à surveiller (p.1)
 - fiche ravageurs (p.3 et 4)
ORGES : - jaunisse nanissantes (p.2)
MAIS : - très fortes infestations de pyrales (p.2)

COLZA

GROSSES ALTISES

Situation : les captures sont très faibles.

Préconisations : inutile d'intervenir. Un traitement ne se justifie que si au moins 3 pieds sur 10 présentent des morsures jusqu'au stade B2.

LIMACES

Situation : les conditions climatiques sont très favorables à ces ravageurs. Et des attaques sont déjà observées.

Préconisations : se reporter au tableau de produits p.4.

- Malice (bensultop) nouveau produit répulsif vis-à-vis du gibier, des animaux domestiques et non attractif pour les oiseaux.

PUCERONS

Situation : aucune infestation n'a encore été observée.

Préconisations : un traitement est justifié lorsque 1 plante sur 5 est colonisée par des pucerons verts ou cendrés.

Nous rappelons que les dégâts occasionnés par les pucerons sont de 2 types :

- directs : ralentissement de croissance pouvant aller jusqu'au dépérissement en cas de très fortes infestations et en période sèche.
- indirects : transmission de viroses entraînant nanisme des plantes contaminées et avortement des siliques.

729

" RESULTATS DES ESSAIS DE L'AUTOMNE 1990 "

5 essais ont été menés par les SPV avec 3 modalités :

- témoin non traité
- traitement raisonné : intervention quand 25 % des plantes sont colonisées
- traitement systématique tous les 15 jours du stade 1^{er} feuille au stade 6 feuilles.

L'espèce *Myzus persicae* (puceron vert) était l'espèce dominante.

Le virus BWYV (virus de la jaunisse occidentale de la betterave) a été mis en évidence dans 96 à 100 % des témoins et 47 à 59 % des parcelles traitées.

essai	nombre de pucerons / 100 plantes	gain de rendement / témoin	
		raisonné	systématique
Champagne 1	faible	+0.3 Qtx	+0.9
Champagne 2	faible	0	+0.1
Basse Normandie	moyen 200 à 500	+7.9	+6.4
Picardie 1	fort jusqu'à 1800	+2.5	+5
Picardie 2	moyen 200 à 500	+7.1	+8.7

Ces résultats confirment la nuisibilité directe et indirecte des pucerons. La présence de virus a été confirmée par les analyses, et des tassements de végétation dans les parcelles témoins (- 15 à - 20 cm) au stade G1 - G2.

ORGE

JAUNISSE NANISSANTE

Situation : les premiers tests réalisés le 24-09 sur des jeunes plants d'orge ont déjà permis d'observer les premiers pucerons virulifères dans la Drôme. Les observations et les tests réalisés par le S.R.P.V. permettront de préciser l'importance du pouvoir virulifère dès la semaine prochaine.

MAIS


PYRALE

Situation : les observations réalisées dans des parcelles non traitées de la Drôme et de l'Isère montrent des niveaux d'infestations très élevés de l'ordre de 6 chenilles par pied de maïs.

Préconisation : récolter les parcelles non traitées en priorité et le plus rapidement possible.

RAVAGEURS DU COLZA

Cherchez-les au bon moment...



Dessins de A. GRAVAUD (Service de la Protection des Végétaux).


... avec la bonne méthode...

Le piégeage ou technique de la cuvette jaune

- **Mise en place des cuvettes** : dès le semis, ou au plus tard à la levée, dès les premiers réchauffements, les installer à 10 mètres de la bordure, du côté d'un ancien champ de colza; les remplir avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle.

Jusqu'au stade B2, la cuvette est enterrée, puis elle est placée à 25 cm de hauteur.

Attention ! Le fond de la cuvette doit suivre le niveau supérieur de la végétation.



- **Surveillance** : 2 fois par semaine et tous les jours après les premières captures.
- **Insectes capturés** : grosse altise, charançon du bourgeon terminal, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

L'observation des plantes

- **Observez 50 plantes** au hasard sur l'ensemble de la parcelle.
- **Insectes** : grosse altise (larve et adulte), puceron cendré du chou, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

... et comptez-les

Quand faut-il traiter ?

Ravageur	Observation des plantes	Piégeage "cuvette jaune"
Limace	Dès les premiers dégâts, du semis au stade B2	
Grosse altise adulte	3 pieds/10 avec morsures nutritionnelles, jusqu'au stade B2	20 à 30 captures cumulées après le stade B2
Grosse altise larve	2 plantes/3 attaquées	
Puceron cendré	— Automne, 1 plante/5 colonisée — De C1 à 3-4 semaines avant la récolte : 2 colonies/m ²	
Charançon du bourgeon terminal		Notez les premières captures : intervenez 10 à 15 jours après si le colza est au stade B3
Gros charançon de la tige		De C1 à T20, intervenir 8 à 10 jours après les premières captures
Meligèthe	— Stades boutons accolés à D1 : 1 insecte par inflorescence — Stades boutons séparés à E : 2 ou 3 insectes	Vous indique les premières arrivées Vous pouvez alors aller observer
Charançon des siliques	A partir des stades G2 G3 : 1 charançon pour 2 pl.	

Les produits de traitement

• Contre les limaces :

- appâts empoisonnés sous forme granulée, épandre régulièrement le soir (25 granulés par m²)
- matières actives : mercaptodiméthur (3 kg/ha - Mesurol antilimaces)
métaldéhyde (5 à 10 kg/ha selon les spécialités commerciales)
thiodicarbe (5 kg/ha - Skipper)

• Contre les insectes :

Au semis			De la levée à la fin du repos hivernal			Produits utilisables (1)		A partir de la reprise de végétation			
Mouche du chou	Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Puceron	Matières actives	Spécialités commerciales	Charançon de la tige	Meligèthe	Charançon des siliques	Puceron
	450 g m.a./ha					benfuracarbe	Oncol 5 G - Oncol S				
9 kg	9 kg	9 kg				carbofuran	Nombreuses spécialités (2)				
9 kg	7,5 kg					carbosulfan	Marshal fort				
	12 kg	12 kg				furathiocarbe	Deltanet				
10 kg	10 kg					terbuphos	Counter plus				
	9 kg					thiofanox	Dacamox 5 G - Dacamox 5 S				
9 kg	9 kg	9 kg				carbofuran - isophenphos	Carma				
	18 kg					phorate + terbuphos	Dispell				
			0,15 l			alphaméthrine	Fastac	0,15 l	0,15 l	0,2 l	
			0,07 l	0,15 l		bifenthrine	Talstar	0,07 l	0,1 l	0,1 l	
			0,3 l	0,3 l		cyfluthrine	Baythroid	0,3 l	0,2 l	0,2 l	
			0,25 l 25 g m.a./ha			cyperméthrine	Cymbush, Kafil super Nombreuses spécialités (2)	0,25 l	0,25 l 20 g m.a./ha	0,25 l	
			0,2 l	0,2 l		deltaméthrine	Décis	0,2 l	0,2 l	0,2 l	
						deltaméthrine + endosulfan	Galion	0,8 l			
						dialiphos	Torak		1,25 l	1,25 l	
			250 g m.a./ha			endosulfan	Nombreuses spécialités (2)	400 g m.a./ha	250 g m.a./ha	600 g m.a./ha	
			0,75 l			endosulfan + parathion éthyl	Drifène AP Ekadrine PE	1,25 l	0,75 l		
						endosulfan + thiométon	Serk EC				1,5 l
			0,6 l			esfenvalérate	Sumi alfa		0,5 l	0,6 l	
			0,5 l			fenvalérate	Sumicidin 10		0,4 l	0,4 l	
			0,2 l			fluvalinate	Mavrik-Mavrik Flo		0,2 l		0,2 l
			0,1 l	0,15 l	0,15 l	lambda-cyhalothrine	Karate	0,15 l	0,1 l	0,1 l	
					1,25 l	lambda-cyhalothrine + pyrimicarbe	Karate K				
			1,5 l ou 1,5 kg			malathion	Nombreuses spécialités (2)		1,5 l ou 1,5 kg		
			1,25 kg			méthidathion	Ultracide 20 bouillie Ultracide 20 liquide	1,5 kg 1,5 l	1,25 kg 1,25 l		
			200 g m.a./ha			parathion éthyl et méthyl	Nombreuses spécialités (2)	300 g m.a./ha	200 g m.a./ha		
			200 g m.a./ha			parathion huileux	Nombreuses spécialités (2)	300 g m.a./ha	200 g m.a./ha		
						phosalone	Zolone Flo-Azofène Flo Nombreuses spécialités (2)		2 l 1.000 g m.a./ha	2,5 l 1.200 g m.a./ha	1,2 l
			0,75 l 0,75 l			phosalone + parathion méthyl	Fortène Taxylone	1,5 l	0,75 l 0,75 l		
						pyrimicarbe	Pirimor G - Aphox				0,5 kg
			0,065 l			tralométhrine	Tracker 108 EC	0,09 l	0,065 l	0,065 l	

(1) Doses en litre ou kilogramme de produit commercial par hectare.

(2) La dose de matière active par hectare mentionnée correspond à la dose de matière la plus fréquente. Avant toute utilisation, vérifier la dose de produit commercial autorisée sur l'étiquette.